

***RHYNCHOLAEIA DIGBYANA* (LINDL.) SCHLTR.
(ORCHIDACEAE)**

ELIANA NOGUERA-SAVELLI

Unidad de Recursos Naturales
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY).
Calle 43, No. 130, Col. Chuburná de Hidalgo, 97200, Mérida, Yucatán, México
eliananoguera@gmail.com



FIGURAS. *Rhyncholaelia digbyana* (foto: Eliana Noguera-Savelli).

La etimología del nombre de esta especie proviene del griego *rhynchos* (nariz) y *Laelia* el nombre de un género de orquídea cercanamente emparentado a ésta; *digbyana* nombrada en honor al Inglés Edward St. Vincent Digby. Esta especie fue descrita inicialmente bajo el género *Brassavola* R. Br., posteriormente fue transferida al género *Rhyncholaelia* Schltr., por la morfología de las plantas, de las flores y de la columna.

Rhyncholaelia consta de dos especies, *R. digbyana* y *R. glauca*. *Rhyncholaelia digbyana* es nativa de México, Belice, Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde crece como epífita, frecuentemente en condiciones de largos períodos de sequía. En la Península de Yucatán es común en la selva baja inundable, con menos frecuencia en las selvas altas subperennifolias, medianas subperennifolias y bajas subcaducifolias.

Esta planta de flores vistosas con el labelo fimbriado fue decretada flor nacional de Honduras en 1969; suele florecer de diciembre hasta Julio y las flores duran generalmente una semana. Existen varios ejemplares de esta planta dentro de la

colección de orquídeas del Jardín Botánico Regional del CICY.

Palabras clave: Orchidaceae, Biogeografía, Florística, Horticultura, Taxonomía.